

# Potentiel date de débourrement suivi de l'Indice de Pouget situation au 15 février 2014- Note N°2


## Information :

Les conditions thermiques hivernales (à partir du 01er janvier) influencent la période débourrement de la vigne. Avec l'appui scientifique de l'ICV et de la chambre d'agriculture de l'Hérault, l'indice potentiel de débourrement est estimé à 100° (source ICV).

L'indice de Pouget permet un suivi par zones méso-climatiques.

## Suivi 2014


### Evolution cumulé de l'Indice de Pouget sur 3 méso-climats de l'Hérault: du 01/01 au 15/02/2014



#### Analyse spatiale :

Au 15 février 2014, l'indice cumulé est compris entre 45°C et 60°C. Il est le plus faible sur le Nord Montpellierais avec un retard d'environ une semaine.


#### Localisation des méso-climats sur l'Hérault



#### Analyse comparative : Millésimes 2009 - 2014

Au 15/02, le potentiel en 2014 est le plus élevé avec des écarts importants par rapport aux années précédentes.

L'écart potentiel est de l'ordre de 20 jours par rapport à 2013 jusqu'à plus de 25 jours en 2010.



## BILAN

Au 15/02, le potentiel en 2014 est très important et il est le plus élevé en comparaison des Millésimes passés.

L'écart est de l'ordre de 20 jours par rapport à 2013.