

2015 - Note N°2

Potentiel date de débourrement


Situation au 01^{er} mars 2015

Information :

Les conditions thermiques hivernales (à partir du 01er janvier) influencent la période débourrement de la vigne. Avec l'appui scientifique de l'ICV et de la chambre d'agriculture de l'Hérault, l'indice potentiel de débourrement est estimé à 100° (source ICV). L'indice de Pouget permet un suivi par zones méso-climatiques.

Suivi 2015

Evolution cumulé de l'Indice d'Huglin sur 3 méso-climats de l'Hérault : du 01/01 au 01/03/2015




Analyse spatiale :

Au 1^{er} mars 2014, l'Indice cumulé est compris entre 45 et 60°C. Il reste plus de 40°C pour atteindre le potentiel soit environ 30 à 35 jours avec des conditions thermiques favorables. Cet indice est le plus faible sur le Nord Montpellierais.

Analyse comparative : Millésime 2010-2015

Au 1^{er} mars, le Millésime 2015 est en retard par rapport à 2014 de près de 15 jours mais il se situe dans la normale des Millésimes 2011 à 2013.

Localisation des méso-climats sur l'Hérault



Evolution de l'Indice d'Huglin sur l'Hérault : 2011-2015 du 01/01 au 01/03

